

KINNITATUD
Kaitseväe juhataja 15.02.2021
käskkirjaga nr 38

MUUDETUD
Kaitseväe juhataja 16.07.2021
käskkirjaga nr 145

Kaitseväe isikkoosseisu immuniseerimise juhend

I. Üldsätted

1. Kaitseväe isikkoosseisu immuniseerimise juhend (edaspidi juhend) reguleerib immunoprofülaktika praktilisi aspekte ja on mõeldud juhiseks immuniseerimisega tegelevatele Kaitseväe tervishoiutöötajatele ning juhendumiseks ametikohale immuniseerimise ja testimise nõude kehtestamisel Kaitseväe isikkoosseisu kuuluvateks loetakse käesoleva juhendi mõttes tegevälased, ajateenijad, Kaitseväe ametnikud ja töötajad.
[/Kinnitatud Kaitseväe juhataja 16.07.2021 käskkirjaga nr 145/](#)
2. Juhend ei käsitle erakorralisi vaktseerimisi nakkushaiguste puhangute korral või bioloogilise relva kasutamise ohu korral.
3. Erakorralisi vaktseerimisi nakkushaiguste puhangute korral korraldatakse Kaitseväe üksustes kooskõlas Kaitseväe peastaabi logistikaosakonna meditsiiniteenistusega.
4. Kaitseväe isikkoosseisu immuniseerimisel eristatakse rutiinset ning välisriikidesse lähetatava või suunatava isikkoosseisu immuniseerimist.
5. Immuunpreparaadi kasutamisel lähtutakse konkreetse preparaadi kasutamishuendi sätetest.

II. Rutiinne immuniseerimine

6. Isikkoosseisu rutiinseks immuniseerimiseks nimetatakse immuniseerimist Eesti Vabariigi territooriumil esinevate nakkushaiguste vastu. Rutiinne immuniseerimine on ettenähtud kogu isikkoosseisule.
7. Kehtiva nõuetekohase immuniseerituse eest vastutab isik ise ning immuniseerimised tagab teeninduspiirkonna meditsiinikeskus.
 - 7.1 Kui seoses bioloogiliste ohuteguritega on kõrgendatud oht teenistuja tervisele, alustab töökeskkonna grupp töökeskkonna ohutegurite riskianalüüsi läbiviimist. Arvestades töökeskkonna riskianalüüsi tulemusi, kehtestatakse ametikohale immuniseerimise ja testimise nõuded, kui riskitase on 6 või kõrgem Kaitseväe toimepidevuse maksimaalset risktasemest või kui täiendava riskianalüüsi tulemusel on nõude kehtestamine vajalik. Nõue lisatakse ametijuhendisse konkreetse nakkushaiguse kohta.
[/Lisatud Kaitseväe juhataja 16.07.2021 käskkirjaga nr 145/](#)
8. Kaitseväe isikkoosseisu rutiinne immuniseerimine toimub alljärgnevate nakkushaiguste vastu:
 - 8.1. difteeria/teetanus/läkakõha (dTpa);

- 8.2. gripp;
- 8.3. A- ja B-hepatiit (meditsiinipersonalile);
- 8.4. puukentsefaliit;
- 8.5. leetrid/mumps/punetised (MMR);
- 8.6. Covid-19.

III. Välisriiki lähetatava või suunatava isikkoosseisu immuniseerimine

- 9. Välisriiki lähetatava või suunatava isikkoosseisu immuniseerimine tähendab isikute immuniseerimist erinevates lähetuse või suunamise piirkondades esinevate nakkushaiguste vastu.
- 10. Isikkoosseisu immuniseerimine sõltub lähetuse või suunamise piirkonnast ja kestusest (vt lisa 1). Nõuded on koostatud eeldusel, et isik on rutiinselt immuniseeritud käesoleva juhendi p 9 ettenähtud vaktsiinidega.
- 11. Sõltumata lähetuse või suunamise piirkonnast ja kestusest immuniseeritakse kiirreageerimisvalmidusega üksuste isikkoosseis ning NATO/EU staapidesse lähetatavaid/suunatavaid isikuid rutiinselt alljärgnevate haiguste vastu:
 - 11.1. difteeria/teetanus/läkakõha (dTpa);
 - 11.2. gripp;
 - 11.3. A- ja B-hepatiit;
 - 11.4. leetrid/punetised/mumps (MMR);
 - 11.5. meningokokk A, C, W135, Y;
 - 11.6. kollapalavik;
 - 11.7. kõhutüüfus;
 - 11.8. marutõbi;
 - 11.9. poliomüeliit;
 - 11.10. puukentsefaliit;
 - 11.11. Covid-19.
- 12. Isikkoosseisu lähetuse või suunamise eelne immuniseerimine toimub Kaitseväe tervise- ja meditsiinikeskustes vastavalt teeninduspiirkonnale. Kollapalaviku vastu vaktsineeritakse vastava sertifikaadi väljaandmise õigust omavas Kaitseväe üksuses või tsiviiltervishoiuasutuses.
- 13. Immuniseerimise skeemid on toodud lisas 2.

Isikkoosseisu immuniseerimine olenevalt lähetuse või suunamise piirkonnast ja kestusest

1. Lähetused kestusega kuni 4 nädalat

Vaktsiin/Riik	Afganistan	Iraak	israel	Balkani riigid	Liibanon	Aafrika riigid	Süüria
Hepatiit A	X	X	X	X	X	X	X
Hepatiit B	X	X	X	X	X	X	X
Kollapalavik						X*	
Kõhutüüfus	X	X			X	X	X
Meningokokk						X**	
Malaaria kemoprofülakтика	X***					X***	

2. Lähetused kestusega üle 4 nädala

Vaktsiin/Riik	Afganistan	Iraak	israel	Balkani riigid	Liibanon	Aafrika riigid	Süüria
Hepatiit A	X	X	X	X	X	X	X
Hepatiit B	X	X	X	X	X	X	X
Kollapalavik						X*	
Kõhutüüfus	X	X		X	X	X	X
Marutõbi	X	X			X	X	X
Meningokokk	X	X	X	X	X	X	X
Poliomüeliit	X	X		X		X	X
Puukentsefaliit				X			
Malaaria kemoprofülakтика	X***					X***	

* Märkus: immuniseerimise vajaduse määrab üksuse arst sõltuvalt konkreetsest Aafrika riigist.

** Märkus: immuniseerimise vajaduse meningokokk A, C, W135,Y vaktsiiniga määrab üksuse arst sõltuvalt konkreetsest Aafrika riigist.

*** Märkus: kemoprofülakтика vajaduse määrab üksuse arst sõltuvalt konkreetsest asukohast ja hooajast.

Immuniseerimise skeemid

Vaktsiin	Manustamise skeem	Revaktsineerimine
Covid-19	Manustamine vastavalt tootja poolt määratud skeemile.	Vastavalt tootja poolt määratud skeemile.
Difteeria/teetanus/ lakköha (dTpa)	Üks doos 0,5 ml.	Iga 10 a tagant
Gripp	Manustamine vastavalt tootja poolt määratud skeemile.	Igal hooajal
Hepatiit A	1. doos (1,0 ml) – valitud kuupäeval; 2. doos (1,0 ml) – 6–18 kuu möödudes.	-
Hepatiit B	1. doos – 1,0 ml – valitud kuupäeval; 2. doos – 1,0 ml – 1 kuu möödumisel; 3. doos – 1,0 ml – 6 kuu möödumisel esimese doosi manustamisest.	-
A/B-hepatiidi divaktsiin	1. doos – 1,0 ml – valitud kuupäeval; 2. doos – 1,0 ml – 1 kuu möödumisel; 3. doos – 1,0 ml – 6 kuu möödumisel esimese doosi manustamisest.	-
Kollapalavik	Üks doos 0,5 ml.	-
Kõhutüüfus	Üks doos 0,5 ml.	3 a tagant
Leetrid, mumps, punetised (MMR)	1. doos – 0,5 ml – valitud kuupäeval; 2. doos – 0,5 ml – 1 kuu möödumisel .	-
Malaaria keemiaprofülaktika	<i>Malarone</i> : 1 tablett (350 mg) iga päev malaaria riskipiirkonnas viibides. Tablettide võtmist alustatakse 2 päeva enne riskipiirkonda jõudmist ning jätkatakse 7 päeva vältel peale riskipiirkonnast lahkumist. <i>Doxycycline</i> : 1 tablett (100 mg) iga päev malaaria riskipiirkonnas viibides. Tablettide võtmist alustatakse 1–2 päeva enne riskipiirkonda jõudmist ning jätkatakse 4 nädala vältel peale riskipiirkonnast lahkumist.	
Marutõbi	1. doos – 1,0 ml – valitud kuupäeval; 2. doos – 1,0 ml – 7 päeval; 3. doos – 1,0 ml – 28 päeval; 4. lisaannus – 1,0 ml – ühe aasta pärast.	5 a tagant
Meningokokk A, C, W135, Y	Üks doos 0,5 ml.	-
Poliomüeliit	Üks doos – 0,5 ml – valitud kuupäeval.	5–10 a tagant
Puukentsefaliit	1. doos – 0,5 ml – valitud kuupäeval; 2. doos – 0,5 ml – 1–3 kuud pärast 1. doosi 3. doos – 0,5 ml – 5–12 kuud pärast 2. doosi	1. Re – 3 a pärast kolmandat doosi; 2. Re ja kõik järgnevad – iga 5 a tagant.