

Eesti levinumad mürktaimed



Pilt 1. Harilik mürkputk
(*Cicuta virosa*)

Mürkputk kasvab veekogude kaldaservades ja madalas kaldavees.


Mürgistusnähtude esimesed tundemärgid on kõrvetus- ja sügelemistunne suus. Sellele järgnevad oksendamine, keele halvatus, kõhuvalu, tugevad krampid, nägemise halvenemine, suur janu.

Mõne tunni jooksul võib mürgistus viia hingamise peatumiseni. Mürgistuskahtluse korral tuleb kohe kutsuda kiirabi.



Pilt 2. Täpiline surmaputk
(*Conium maculatum*)

Kasvab Eestis hajusalt. Enamasti prahipaikades, elamute ümbruses, teeservadel ja võsastikes. Looduslikes tingimustes sagedamini lamminiidul, metsaservades, mererannikul.



Pilt 3. Harilik maavits
(*Solanum dulcamara*)

Eestis tavaline. Maavitsa võib leida veekogudeäärsetest võsastikest, soodest ja lodudest. Marjade söömisel võib esineda iiveldust, oksendamist, valulikku kõhulahtisust, kiiret pulssi ja hingamishäiret, peapööritust, palavikku, rasketel juhtudel krambid ja kõnehäiret. Suurem osa mürgist väljub oksendamisel.



Pilt 4. Harilik jugapuu
(*Taxus baccata*)

Eestis kasvab jugapuu Lääne-Eestis, peamiselt Hiiumaal ja Saaremaal. Mürgised on eelkõige jugapuu okkad ja seemned. Okaste ja seemnete söömisel tekib kõhulahtisus ja peapööritus, pupillide laienemine ja teadvusetus. Pulss muutub algul kiiremaks, siis aga nõrgemaks. Surm saabub krampide sagedes südametegevuse ja hingamise lakkamise tõttu.



Pilt 5. Harilik kikkapuu
(*Euonymus europaeus*)

Lõuna-Eestis leiduva hariliku kikkapuu viljad, lehed ja koor on mürgised ning puidutolm mõjutab ärritavalt. Seemned sisaldavad glükosiide ja alkaloide. Mürgistustunnusteks on iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhulahtisus, kehatemperatuuri tõus, hingeldamine, vereringehäired, nõrkus, krambid ja rasketel juhtudel kooma.